



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ  
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ

STATE COMMITTEE  
FOR VETERINARY MEDICINE OF UKRAINE

## РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину", Положення про реєстрацію (перереєстрацію) ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок в Україні та на основі висновку Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини

препарат Адвокат® для котів

у формі крапель для зовнішнього застосування

Власник реєстраційного посвідчення (юридична особа, відповідальна за препарат)

*фірма Байер Енімал Хелс ГмбХ  
D-51368, Леверкузен  
Німеччина*

зарєєстровано в Україні за № 4049-01-959-08/1 від 24.12.2008 р.

Виробник :

*фірма КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ  
Проєнсдорфер стр. 324 , D-24106 Кіль  
Німеччина*

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка (додаток 2);
- етикетка (додаток 3);

Реєстрації не посвідчення дійсне до 28.02.2013 р.

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного препарату.

Голова Державного комітету ветеринарної медицини  
України - Головний державний інспектор ветеринарної  
медицини  
Chairman of the State committee for veterinary medicine of  
Ukraine - Chief state inspector of Veterinary Medicine



**Г.Б.Іванов**

Додаток 2  
до реєстраційного  
посвідчення № 4049-01-959-08/1  
від 24.12.2008 р..

**ЛИСТІВКА-ВКЛАДКА**  
**(Настанова по застосуванню)**  
**Адвокат® для котів**

**Опис**

Прозорий розчин.

**Склад**

1 піпетка містить діючі речовини:

імідаклоприд – 10%, моксідектин – 1%,

допоміжні речовини: бензиловий спирт, 0,1 % бутилгідрокситолуен (Е 321, як антиоксидант).

Кожна доза (піпетка) Адвокату® спот-он розчину для котів містить:

	Піпетка	Імідаклоприд	Моксідектин
Адвокат для малих котів ( $\leq 4$ кг)	0,4 мл	40 мг	4 мг
Адвокат для великих котів ( $>4-8$ кг)	0,8 мл	80 мг	8 мг

**Фармакологічні властивості**

АТС vet: QP54AB02, QP53AX17.

Адвокат® спот-он розчин для котів – це ендектопаразитицид зовнішнього застосування.

Імідаклоприд, 1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-ylideneamine – ектопаразитицид, належить до групи хлорнікотинілових сполук. Перериває передачу нервового імпульсу, що в подальшому призводить до паралічу та загибелі паразита. Не впливає на ЦНС ссавців.

Моксідектин, 23-(O-methyloxime)-F28249 альфа – належить до другого покоління макроциклічних лактонів, група мільбеміцинів. Це паразитицид, який діє проти багатьох ендо- та ектопаразитів. Внаслідок дії моксідектину відбувається незворотне зниження м'язової активності, параліч та загибель паразитів.

**Застосування**

Для лікування та попередження зараження блохами (*Ctenocephalides felis*), лікування алергічного блошиного дерматиту, лікування отодектозу (спричиненого *Otodectes cynotis*), профілактика дирофіляріозу (знищує мікрофілярії L3 та L4 *Dirofilaria immitis*), лікування гастроінтестинальних нематодозів (личинки L4, незрілі та імаго *Toxocara cati*, *Ancylostoma tubaeforme*).

**Дозування**

Мінімальна терапевтична доза 10 мг/кг маси тіла імідаклоприду та 1,0 мг/кг маси тіла моксідектину, що еквівалентно 0,1 мл/кг ваги препарату Адвокат® для котів.

Вага кота, кг	Розмір піпетки	Об'єм, (мл)	Імідаклоприд (мг/кг ваги)	Моксідектин (мг/кг ваги)
$\leq 4$ кг	Адвокат® для малих котів	0,4	Мінімум 10	Мінімум 1
$> 4-8$ кг	Адвокат® для великих котів	0,8	10-20	1-2
$> 8$ кг	Використовувати відповідну комбінацію піпеток			

Лікування та попередження зараження блохами. Однократна обробка препаратом знищує та попереджає зараження блохами протягом 4-6 тижнів. Доцільно поєднати обробку тварини препаратом Адвокат® з обробкою місць перебування тварини (наприклад аерозолем Больфо®). При лікуванні алергічного блошиного дерматиту препарат застосовувати щомісяця.

Лікування отодектозу. Рекомендована однократна обробка. Бажано проконсультуватись у ветеринарного спеціаліста через 30 днів після лікування, оскільки деякі тварини потребують повторної обробки. Не наносити препарат безпосередньо у вухний канал.

Попередження дирофіляріозу. Препарат потрібно застосовувати, починаючи за 1 місяць до періоду активності кровосисних комах (квітень) та закінчуючи через 1-2 місяці після завершення періоду їх активності (жовтень). Інтервал між обробками – 30 днів. Рекомендовано перед

профілактичною обробкою провести діагностику дирофіляріозу у котів старше 6 місяців. Якщо у тварини підтвердили наявність зрілих форм дирофілярій, то лікування повинно проводитись у відповідності із сучасними методиками.

Нематодози. Щомісячна обробка Адвокатом® знижує можливість реінвазії нематодами. Адвокат® можна застосовувати як сезонну обробку проти нематодозів.

#### Застосування

Для зовнішнього застосування. Видаліть піпетку з упаковки, зніміть ковпачок, проколить захисну фольгу. Розділіть шерсть в області шиї біля основи черепа тварини так, щоб видно було шкіру. Розмістіть кінчик піпетки на шкіру, стисніть піпетку, щоб препарат розмістити безпосередньо на шкіру. Нанесення біля основи черепа дозволяє уникнути можливості злизування препарату твариною. Наносити препарат на непошкоджену шкіру.

#### **Протипоказання**

Не застосовувати кошенятам віком до 9-ти тижнів.

Лікування хворих та ослаблених тварин, і масою тіла до 1 кг повинно ґрунтуватися на оцінці ризику та необхідності лікування.

У дуже рідких випадках може виникати короточасний свербіж, забруднення шерсті, еритема на шкірі, блювота. Всі ці ознаки зникають без лікування. Препарат гіркий, тому, якщо тварина злиже місце аплікації після обробки, в рідких випадках можлива слинотеча, що не є ознакою інтоксикації і проходить за кілька хвилин, іноді при злизуванні можливі нервові розлади, які також швидко проходять. Правильне нанесення препарату мінімізує можливість злизування препарату твариною.

#### **Застереження**

Часте застосування шампуню може знизити ефективність препарату.

По закінченні обробки необхідно ретельно вимити руки теплою водою з милом. При випадковому попаданні препарату на шкіру, слизові оболонки необхідно ретельно проточити їх проточною водою. Якщо подразнення шкіри або очей не проходить, або препарат випадково потрапив у шлунково-кишковий тракт необхідно звернутися до лікаря і показати листівку-вкладку з упаковки. Використані піпетки з-під препарату запаковують в поліетиленовий пакет та викидають у контейнер для сміття.

#### **Форма випуску**

Піпетки по 0,4 мл та 0,8 мл, запаковані в блістери по 3, 4 або 6 штук.

#### **Зберігання**

У закритій упаковці виробника, в сухому недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 0 до 30 °С.

Термін придатності - 3 роки

***Тільки для ветеринарного застосування!***

#### ***Власник реєстраційного посвідчення:***

Байер Енімал Хелс ГмбХ, Леверкузен, Німеччина

#### ***Виробник готового продукту:***

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ, Німеччина