



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ

STATE COMMITTEE
FOR VETERINARY MEDICINE OF UKRAINE

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину", Положення про реєстрацію (перереєстрацію) ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок в Україні та на основі висновку Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини

препарат Адвантейдж®

у формі розчину для зовнішнього застосування

Власник реєстраційного посвідчення (юридична особа, відповідальна за препарат)

фірма Байер Енімал Хелс ГмбХ
D-51368, Леверкузен
Німеччина

zareestrovano v Ukraїni za № 4018-01-1170-08 від 24.12.2008 p.

Виробник :

фірма КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ
Проєнсдорфер стр. 324 , D-24106 Кіль
Німеччина

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка (додаток 2);
- етикетка (додаток 3);

Реєстрації не посвідчення дійсне до 24.12.2013 p.

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного препарату.

Голова Державного комітету ветеринарної медицини
України - Головний державний інспектор ветеринарної
медицини
Chairman of the State committee for veterinary medicine of
Ukraine - Chief state inspector of Veterinary Medicine



Г.Б.Іванов

Додаток 2
до реєстраційного
посвідчення № 4018-01-1170-08
від 24.12.2008 р.

ЛИСТІВКА-ВКЛАДКА
(Настанова по застосуванню)
Адвантейдж®

Опис

Прозорий розчин від жовтого до світло-коричневого кольору.

Склад

100 мл препарату містять діюча речовина імідаклоприд – 10,0 г.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP53AX17

Діюча речовина препарату **Імідаклоприд**, 1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine – ектопаразитицид, що належить до групи хлорнікотинілових сполук. Має високу спорідненість до нікотинергічних ацетилхолінових рецепторів у постсинаптичних ділянках центральної нервової системи бліх. Він приєднується до нікотинергічного рецептора, розміщеного на постсинаптичному нейроні, перериває передачу нервового імпульсу, що в подальшому призводить до загибелі паразита.

Слабка взаємодія імідаклоприду з нікотиновими рецепторами ссавців обумовлює низький рівень проникнення через гематоенцефалічний бар'єр, тому імідаклоприд практично не впливає на ЦНС тварин. Імідаклоприд ефективний проти личинок бліх та зрілих особин.

Після місцевого застосування препарату, імідаклоприд швидко розповсюджуються по всій шкірі тварини впродовж однієї доби після нанесення. Клінічно доведено, що системна абсорбція препарату дуже низька.

Застосування

Профілактика та лікування котів і декоративних кролів при ураженні блохами *Ctenocephalides felis*. Препарат може бути застосований для лікування алергічного блошиного дерматиту. Одна обробка захищає тварину від повторної інвазії протягом 4-х тижнів.

Дозування


Для тварин масою тіла до 4 кг застосовують 1 піпетку Адвантейдж®40 (0,4 мл), масою тіла більше 4 кг - 1 піпетку Адвантейдж®80 (0,8 мл).

Повторна інвазія блохами із зовнішнього середовища можлива через 6 тижнів і більше після обробки. Додатково рекомендується обробляти місця перебування тварин (підстилки, коврики) для знищення дорослих та личинкових стадій бліх.

Препарат не втрачає ефективності при намоканні шерсті тварини, але у таких випадках можлива додаткова обробка – залежно від наявності бліх у навколишньому середовищі. У таких випадках не рекомендується обробляти тварину частіше, ніж 1 раз на тиждень.

Спосіб застосування:

Вийміть піпетку з упакування, тримайте у вертикальному положенні. Зніміть ковпачок, переверніть його та одягніть на піпетку, таким чином видаливши фольгу.



Розділіть шерсть на шиї тварини біля основи черепа так, щоб було видно шкіру. Розмістіть вузький кінець піпетки на шкіру, міцно стисніть піпетку декілька разів, щоб нанести весь вміст безпосередньо на шкіру.



Використовувати тільки на непошкоджену шкіру. Не допускати щойно оброблених тварин вилизувати одне одного.

Протипоказання

Не застосовувати кошенятам віком до 8-ми тижнів.
Не застосовувати декоративним кролям до 10-ти тижнів.
Не застосовувати кролям, м'ясо яких призначається для вживання в їжу людям.

Застереження

Обробку тварин рекомендується проводити у гумових рукавицях.
Під час роботи з препаратом не дозволяється палити, пити і приймати їжу.
Після закінчення роботи необхідно вимити руки теплою водою з милом.
Не можна гладити тварину і допускати її до маленьких дітей протягом 48 годин після обробки препаратом.
При випадковому попаданні препарату на шкіру або слизові оболонки його необхідно відразу промити проточною водою. Якщо після попадання препарату на шкіру або в очі подразнення після промивання водою не зникає, необхідно звернутися за медичною допомогою.

Форма випуску

Пропіленові піпетки по 0,4 мл (Адвантейдж®40) і по 0,8 мл (Адвантейдж®80).

Зберігання

Сухе, темне добре вентилязоване приміщення на стелажах при температурі від 5 до 25 °С.
Зберігати окремо від продуктів харчування та кормів.
Термін придатності - 5 років.

Власник реєстраційного посвідчення виробник продукту:

Байер Енімал Хелс ГмбХ, Німеччина

Виробник продукту:

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ, Німеччина