



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ

STATE COMMITTEE
FOR VETERINARY MEDICINE OF UKRAINE

РЕЄСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину", Положення про реєстрацію (перереєстрацію) ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок в Україні та на основі висновку Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини

препарат Кілтікс® для собак

у формі нашийника

Власник реєстраційного посвідчення (юридична особа, відповідальна за препарат)

фірма Байєр Енімал Хелс ГмбХ
D-51368, Леверкузен
Німеччина

zareєстровано в Україні за № 4060-01-867-07/1 від 24.12.2008 р.

Виробник :

фірма КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ
Проєнсдорфер стр. 324 , D-24106 Кіль
Німеччина

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка (додаток 2);
- етикетка (додаток 3);

Реєстраційне посвідчення дійсне до 31.05.2012 р.

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного препарату.

Голова Державного комітету ветеринарної медицини
України - Головний державний інспектор ветеринарної
медицини
Chairman of the State committee for veterinary medicine of
Ukraine - Chief state inspector of Veterinary Medicine



Г.Б.Іванов

Додаток 2
до реєстраційного
посвідчення № 4060-01-867-07/1
від 24.12.2008 р.

ЛИСТІВКА-ВКЛАДКА
(Настанова по застосуванню)
Кілтікс® для собак

Опис

Поліхлорвініловий нашійник жовтого кольору.

Склад

10 г нашійника містять діючі речовини :

пропоксур - 1,00 г,
флуметрин - 0,225 г.

Фармакологічні властивості

АТСvet QP53AC05, QP53AE02.

Діючі речовини нашійника пропоксур та флуметрин виявляють синергічну дію на паразитоформні кліщі (*Rhipicephalus sanguineus* і *Ixodes ricinus*) та блохи (*Ctenocephalides canis*) у собак.

Пропоксур – ектопаразитицид, діє на паразита як контактна отрута, викликаючи токсичну акумуляцію нейрогормону ацетилхоліну на холінергічних нервових закінченнях, внаслідок чого настає загибель ектопаразитів (блохи, кліщі, воші та інші). Для ссавців пропоксур нетоксичний.

Флуметрин – ектопаразитицид синтетичної групи піретроїдів, має високу акарицидну активність. За останніми дослідженнями синтетичні піретроїди взаємодіють з натрієвими каналцями мембран нервових клітин, викликають загибель ектопаразитів внаслідок деполяризації нервових закінчень.

Фармакокінетика.

Діючі речовини постійно виділяючись із нашійника переносяться на шкірно-волосяний покрив тварини, діють синергічно, інсекто-акарицидно і репелентно на блохи, воші, волосоїди і кліщі, які паразитують на собаках. Комбінація пропоксуру та флуметрину в значній мірі підсилює ефективність проти ектопаразитів у порівнянні до їх поокремого використання. Нашійник добре переноситься тваринами, не має місцево-подразнюючої і шкірно-резорбтивної дії. Токсичний для риби та бджіл.

Застосування

Профілактика та лікування собак при ураженні ектопаразитами: блохами (*Ctenocephalides canis/felis*), кліщами (*Ixodes ricinus* і *Rhipicephalus sanguineus*).

Дозування

Для великих порід собак - нашійник довжиною 66 см (45 г), для середніх порід собак - 48 см (30,2 г), для дрібних порід собак – 35 см (12,5 г).

Після відкриття упакування нашійник розгортають, видаляють тонкі пластикові перегородки на внутрішній стороні і вільно закріплюють навколо шиї собаки таким чином, щоб між шиєю та нашійником залишався проміжок у 2 пальці, потім закривають пряжкою. Нашійник повинен бути вільним на шиї і не стримувати росту тварини. Підігнаний належним чином нашійник у закріпленому стані повинен вільно рухатися.

Постійне використання нашійника Кілтікс® для середніх та великих собак забезпечує захист тварини від ектопаразитів протягом 7 місяців, для маленьких собак – 6 місяців.

Ефективність нашійника проти кліщів та бліх спостерігається через 24 годин після початку його застосування. Тривалість і рівень захисту залежить від довжини, густоти та стану шерсті тварини, також від ступеню ураження ектопаразитами. При зниженні ефективності дії нашійника його необхідно замінити на новий.

Перед купанням тварин нашійник необхідно знімати. Значне зволоження шерсті і шкіри тварини (дощ, купання, плавання) знижують ефективність нашійника.

Протипоказання

Не застосовувати одночасно з нашійником інші інсектицидні препарати. Не призначати хворим і ослабленим тваринам.

При ознаках подразнення шкіри зняти нашійник і звернутися до ветеринарного лікаря.

Застереження

Після контакту з нашійником необхідно ретельно вимити руки теплою водою з милом.

Форма випуску

Поліхлорвініловий нашійник у герметичному упакуванні, вкладений у картонну коробку. Для великих порід собак – 66 см (45,0 г), середніх порід собак – 48 см (30,2 г), для дрібних порід собак – довжиною 35 см (12,5 г).

Зберігання

Зберігати препарат у закритій упаковці виробника, в сухому недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 15 до 25 °С.

Термін придатності -5 років.

Тільки для ветеринарного застосування!

Власник реєстраційного посвідчення:

Байер Енімал Хелс ГмбХ, Леверкузен, Німеччина

Виробник готового продукту:

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ, Німеччина