



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ УКРАЇНИ

STATE COMMITTEE
FOR VETERINARY MEDICINE OF UKRAINE

РЕЕСТРАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ REGISTRATION CERTIFICATE

Відповідно до Закону України "Про ветеринарну медицину", Положення про реєстрацію (перереєстрацію) ветеринарних препаратів, субстанцій, готових кормів та кормових добавок в Україні та на основі висновку Державної фармакологічної комісії ветеринарної медицини

препарат Профендер® для котів

у формі крапель для зовнішнього застосування

Власник реєстраційного посвідчення (юридична особа, відповідальна за препарат)

*фірма Байер Енімал Хелс ГмбХ
D-51368, Леверкузен
Німеччина*

zareestrovano v Ukraїni za № 4061-01-712-06/1 від 24.12.2008 p.

Виробник :

*фірма КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ
Проенсдорфер стр. 324 , D-24106 Кіль
Німеччина*

При будь-якій зміні в реєстраційному досьє власник посвідчення (виробник) повинен повідомити орган реєстрації.

Обов'язкові додатки:

- коротка характеристика препарату (додаток 1);
- листівка-вкладка (додаток 2);
- етикетка (додаток 3);

Реєстраційне посвідчення дійсне до 06.10.2011 p.

Це посвідчення не є зобов'язанням щодо закупівлі даного препарату.

Голова Державного комітету ветеринарної медицини
України - Головний державний інспектор ветеринарної
медицини
Chairman of the State committee for veterinary medicine of
Ukraine - Chief state inspector of Veterinary Medicine



Г.Б.Іванов

Додаток 2
до реєстраційного
посвідчення № 4061-01-712-06/1
від 24.12.2008 р.

ЛИСТІВКА-ВКЛАДКА
(Настанова по застосуванню)
Профендер® для котів

Опис

Прозорий жовтуватого – коричневого розчину.

Склад

100 мл препарату містять:

активно-діючі речовини:

емодепсид - 2,143 г;

празіквантел - 8,575 г.

Фармакологічні властивості

AATCVET QP52AA51.

Профендер® для котів – це ендопаразитицид для місцевого використання. Фармакологічні властивості препарату зумовлені властивостями діючих речовин.

Емодепсид це напівсинтетична сполука, яка належить до групи депсипептидів. Емодепсид ефективний проти *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma tubaeforme*. Він стимулює пресинаптичні латрофілінові нервові рецептори паразитів, що призводить до паралічу та їх загибелі.

Празіквантел – є похідним піразинізохінолонів, ефективний проти цестод на різних стадіях розвитку у різних видів тварин – *Dipylidium caninum*, *Echinococcus multilocularis*, *Taenia taeniaeformis*.

Празіквантел швидко абсорбується через усю поверхню паразита, в результаті чого руйнується оболонка та настає параліч паразита. Така швидка дія обумовлена зміною проникливості клітинних мембран до іонів кальцію. Подібне порушення метаболізму спричиняє швидку смерть паразита.

Застосування

Дегельмінтизація котів при змішаних паразитарних інвазіях:

- нематоди - зрілі, незрілі та личинкові форми (личинки 3 та 4 стадії) *Toxocara cati*, а також зрілі, незрілі та личинкові форми (личинки 4 стадії) *Toxascaris leonina*,
- зрілі, незрілі та личинкові форми (личинки 4 стадії) *Ancylostoma tubaeforme*,
- цестоди – зрілі та незрілі форми *Dipylidium caninum*, *Taenia taeniaeformis* та зрілі стадії *Echinococcus multilocularis*.

Дозування

Препарат рекомендується лише для зовнішнього застосування.

Мінімальна рекомендована доза емодепсиду - 3 мг/кг маси тіла та празіквантелу - 12 мг/кг маси тіла, що еквівалентно 0,14 мл Профендера®/ кг маси тіла.

Схема дозування препарату Профендер® Спот Он:

Коти (маса тіла, кг)	Дозування (упаковка Профендера®)	Емодепсид (мг/кг маса тіла)	Празіквантел (мг/кг маса тіла)
0,5 - 2,5 кг	0,35 мл Профендер® для котів від 0,5	3-15	12-60

	до 2,5 кг		
2,5 кг - 5 кг	0,7 мл Профендер® для котів від 2,5 кг до 5 кг	3-6	12-24
5 кг - 8 кг	1,12 мл Профендер® для котів від 5 кг до 8 кг	3-4,8	12-19,2

Для котів масою тіла більше 8 кг слід застосовувати комбінацію піпеток.

Достатньо одноразової обробки.

Рекомендовано проводити дегельмінтизацію кожні 3 місяці.

Піпетку з препаратом необхідно тримати вертикально, повернути та зняти ковпачок.

Видалити піпетку з упаковки і тримати її в вертикальному положенні. Перевернути ковпачок та другим кінцем вставити його у піпетку. Провернути ковпачок так, щоб зірвати печатку і зняти ковпачок з піпетки. Розгорнути шерстяний покрив тварини в області потилиці, розмістити вужчий кінець піпетки на шкіру та декілька разів здавити піпетку, таким чином видавити препарат на шкіру. При нанесенні препарату на шкіру уникати можливість злизування твариною нанесеного засобу.

Протипоказання

Не застосовувати котенятам віком до 8 тижнів, а також вагою менше 0,5 кг.

У котів, які випадково злизали препарат відразу після нанесення, можуть виникнути ускладнення: слинотеча та блювота.

Застереження

Препарат наносити лише на поверхню шкіри, не застосовувати орально чи парентерально. Наносити лише на непошкоджену шкіру. Стійкість паразитів до складових Профендера® може виникнути лише у випадках довготривалого частого застосування антигельмінтиків цього класу.

Після застосування препарату тварин не купати.

При ознаках ускладнень у тварин при застосуванні препарату необхідно утриматися від його подальшого застосування і проконсультуватися з ветеринарним спеціалістом.

Перед застосуванням препарату необхідно уважно прочитати листівку-вкладку.

Під час обробки тварин не можна палити, пити і приймати їжу.

При обробці тварин препаратом рекомендується користуватися захисними рукавичками.

По закінченні обробки необхідно ретельно вимити руки теплою водою з милом.

При випадковому попаданні препарату на шкіру, слизові оболонки необхідно ретельно промити їх проточною водою. Якщо подразнення шкіри або очей не проходить, або препарат випадково потрапив у шлунково-кишковий тракт необхідно звернутися до лікаря і показати листівку-вкладку з упаковки.

Розчинник, що входить до складу Профендера® Спот Он, може залишати плями на деяких матеріалах (шкіра, тканини, пластик та інші поверхні).

Використані піпетки-туби з-під препарату запаковують в поліетиленовий пакет та викидають у контейнер для сміття, забороняється повторно використовувати їх для побутових потреб.

Форма випуску

Поліпропіленові туби (піпетки) по 0,35 мл; 0,7 мл; 1,12 мл.

Зберігання

Зберігати препарат у закритій упаковці виробника, в сухому недоступному для дітей та тварин місці, окремо від харчових продуктів та кормів, за температури від 0 до 30 С.

Термін придатності - 3 роки

Тільки для ветеринарного застосування!

Власник реєстраційного посвідчення:

Байер Енімал Хелс ГмбХ, Леверкузен, Німеччина

Виробник готового продукту:

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ, Німеччина